INTÉGRALES DE MOHR résultat x $1/EI$	m — m	m_g — m_d	m_g / m_d	m_g — m_d	m; $\alpha.l$ $\beta.l$; $\alpha+\beta=1$	m_g	m_d	m_g	m_d	m
M — M	M.m	1/2 M.(m_g + m_d)	1/2 M.(m_g + m_d)	1/2 M.m_g	1/2 M.m_d	1/2 M.m	1/3 M.m_g	1/3 M.m_d	2/3 M.m_g	2/3 M.m_d	2/3 M.m
M_g — M_d	1/2 m.(M_g + M_d)	1/6 (2M_g.m_g + M_g.m_d + M_d.m_g + 2M_d.m_d)	1/6 (2M_g.m_g + M_g.m_d + M_d.m_g + 2M_d.m_d)	1/6 m_g.(2M_g + M_d)	1/6 m_d.(M_g + 2M_d)	1/6 m.[M_g(1 + β) + M_d(1+α)]	1/12 m_g.(3M_g + M_d)	1/12 m_d.(3M_d + M_g)	1/12 m_g.(5M_g + 3M_d)	1/12 m_d.(3M_g + 5M_d)	1/3 m.(M_g + M_d)
M_g — M_d	1/2 m.(M_g + M_d)	1/6 (2M_g.m_g + M_g.m_d + M_d.m_g + 2M_d.m_d)	1/6 (2M_g.m_g + M_g.m_d + M_d.m_g + 2M_d.m_d)	1/6 m_g.(2M_g + M_d)	1/6 m_d.(M_g + 2M_d)	1/6 m.[M_g(1 + β) + M_d(1+α)]	1/12 m_g.(3M_g + M_d)	1/12 m_d.(3M_d + M_g)	1/12 m_g.(5M_g + 3M_d)	1/12 m_d.(3M_g + 5M_d)	1/3 m.(M_g + M_d)
M_g	1/2 M_g.m	1/6 M_g(2m_g + m_d)	1/6 M_g(2m_g + m_d)	1/3 M_g.m_g	1/6 M_g.m_d	1/6 M_g.m.(1+β)	1/4 M_g.m_g	1/12 M_g.m_d	5/12 M_g.m_g	1/4 M_g.m_d	1/3 M_g.m
M_d	1/2 M_d.m	1/6 M_d(m_g + 2m_d)	1/6 M_d(m_g + 2m_d)	1/6 M_d.m_g	1/3 M_d.m_d	1/6 M_d.m.(1+α)	1/12 M_d.m_g	1/4 M_d.m_d	1/4 M_d.m_g	5/12 M_d.m_d	1/3 M_d.m
M; $\alpha.l$ $\beta.l$; $\alpha+\beta=1$	1/2 M.m	1/6 M.[m_g(1 + β) + m_d(1+α)]	1/6 M.[m_g(1 + β) + m_d(1+α)]	1/6 M.m_g.(1+β)	1/6 M.m_d.(1+α)	1/3 M.m	1/12 M.m_g.(1+β+β^2)	1/12 M.m_d.(1+α+α^2)	1/12 M.m_g.(5-α-α^2)	1/12 M.m_d.(5-β-β^2)	1/3 M.m.(1+ αβ)
M_g	1/3 M_g.m	1/12 M_g(3m_g + m_d)	1/12 M_g(3m_g + m_d)	1/4 M_g.m_g	1/12 M_g.m_d	1/12 M_g.m.(1+β+β^2)	1/5 M_g.m_g	1/30 M_g.m_d	3/10 M_g.m_g	2/15 M_g.m_d	1/5 M_g.m
M_d	1/3 M_d.m	1/12 M_d(m_g + 3m_d)	1/12 M_d(m_g + 3m_d)	1/12 M_d.m_g	1/4 M_d.m_d	1/12 M_d.m.(1+α+α^2)	1/30 M_d.m_g	1/5 M_d.m_d	2/15 M_d.m_g	3/10 M_d.m_d	1/5 M_d.m
M_g	2/3 M_g.m	1/12 M_g(5m_g + 3m_d)	1/12 M_g(5m_g + 3m_d)	5/12 M_g.m_g	1/4 M_g.m_d	1/12 M_g.m.(5-α-α^2)	3/10 M_g.m_g	2/15 M_g.m_d	8/15 M_g.m_g	11/30 M_g.m_d	7/15 M_g.m
M_d	2/3 M_d.m	1/12 M_d(3m_g + 5m_d)	1/12 M_d(3m_g + 5m_d)	1/4 M_d.m_g	5/12 M_d.m_d	1/12 M_d.m.(5-β-β^2)	2/15 M_d.m_g	3/10 M_d.m_d	11/30 M_d.m_g	8/15 M_d.m_d	7/15 M_d.m
M	2/3 M.m	1/3 M(m_g + m_d)	1/3 M(m_g + m_d)	1/3 M.m_g	1/3 M.m_d	1/3 M.m.(1+ αβ)	1/5 M.m_g	1/5 M.m_d	7/15 M.m_g	7/15 M.m_d	8/15 M.m

INTÉGRALES DE MOHR résultat x l/EI	$\frac{1}{l}\int M^2 . dx$	
	M^2	$1/6\ M(m_g + 4m_t + m_d)$
	$1/3\ (M_g^2 + M_g.M_d + M_d^2)$	$1/6\ (M_g.m_g + 4M.m_t + M_d.m_d)$
	$1/3\ (M_g^2 + M_g.M_d + M_d^2)$	$1/6\ (M_g.m_g + 4M.m_t + M_d.m_d)$
	$1/3\ M_g^2$	$1/6\ M_g(m_g + 2m_t)$
	$1/3\ M_d^2$	$1/6\ M_d(2m_t + m_d)$
	$1/3\ M^2$	$1/6\ M[-2m_o(1+\alpha+\alpha^2) + (4m_o - m_g + m_d).(1+\alpha) + 3m_g]$
	$1/5\ M_g^2$	$1/60\ M_g[5(3m_g + m_d) + 12m_o]$
	$1/5\ M_d^2$	$1/60\ M_d[5(m_g + 3m_d) + 12m_o]$
	$8/15\ M_g^2$	$1/60\ M_g[5(5m_g + 3m_d) + 28m_o]$ **ou** $1/60\ M_g(11m_g + m_d + 28m_t)$
	$8/15\ M_d^2$	$1/60\ M_d[5(3m_g + 5m_d) + 28m_o]$ **ou** $1/60\ M_d(m_g + 11m_d + 28m_t)$
	$8/15\ M^2$	$1/15\ M\ [5(m_g + m_d) + 8m_o]$

Attention: le sommet ne se trouve pas forcément au milieu

$$m_t = m_o + \frac{m_d + m_g}{2}$$